

## Ansteckende Borkenflechte (Impetigo contagiosa)

**Erreger** 80% A-Streptokokken, 20% Staphylokokkus aureus

**Vorkommen** kommen auf der ganzen Welt vor; gehören zu den häufigsten bakteriellen Infektionen im Kindesalter

**Übertragungswege** Die Übertragung der Erreger erfolgt durch Berühren der betroffenen Hautareale oder Kontakt mit Kleidung auf der die Erreger haften.

**Inkubationszeit** 2-10 Tage

**Krankheitsbild** Oberflächliche sehr ansteckende Hautinfektion, die meist ohne Fieber im Gesichtsbereich aber auch an anderen Körperstellen auftritt. Typisch sind eitrig Hautbläschen, die bald nach Entstehen platzen und eine honiggelbe Kruste hinterlassen.

**Ansteckungsdauer** Ohne Behandlung sind die Patienten ansteckend, bis das letzte Hautbläschen abgeheilt ist.

**Behandlung** Je nach Schwere der Erkrankung ist eine lokale bzw. eine systemische Antibiotikatherapie notwendig.

**Zulassung nach Krankheit** 24 Stunden nach Beginn einer wirksamen Therapie können die Erkrankten mit einem schriftlichen ärztlichen Attest die Einrichtung wieder besuchen.

---