

Infektiöse Gastroenteritis durch **Yersinia enterocolitica**

Erreger Yersinia enterocolitica – Bakterien, verschiedene Untergruppen (Serotypen); Yersinien können sich auch bei Temperaturen von 0 - 4° C vermehren

Vorkommen kommen auf der ganzen Welt vor; besonders häufig in Europa

Übertragungswege in erster Linie durch kontaminierte Lebensmittel oder infiziertes Wasser; die Erreger können auch durch Kontakt mit Haustieren wie Meerschweinchen, Hund, Hase, Katze (Kratzwunden) und Schwein übertragen werden

Inkubationszeit meistens 7 bis 10 Tage

Krankheitsbild akute Magen-Darm-Entzündung (Gastroenteritis) mit Fieber, Durchfall, Übelkeit und Bauchkrämpfen;
kann mit einer Blinddarm-Entzündung verwechselt werden;
die Erkrankung tritt häufig bei Kindern unter 15 Jahren auf

Ansteckungsdauer solange Erreger mit dem Stuhl ausgeschieden werden

Behandlung antibiotische Behandlung ist möglich

Hygiene Die Übertragung der **Yersinien-Bakterien** kann durch eine **konsequente Händehygiene** verhindert werden. Bei Kontakt mit dem Stuhl eines Erkrankten sollen sich die Personen anschließend die Hände gründlich reinigen und desinfizieren.